

4. RADIKÁL IDEÁLU, NULLSTELLENSATZ

- 25.** Pre ľubovoľný ideál I okruhu R ukážte, že \sqrt{I} je ideál.
- 26.** (m) Nech I je ideál v okruhu R . Ktoré z nasledovných tvrdení sú praavdivé?
- (a) Ak I je maximálny, potom je radikálový.
 - (b) Ak I je prvoideál, potom je radikálový.
 - (c) Ak I je radikálový, potom je maximálny.
 - (d) Ak I je radikálový, potom je prvoideál.

Svoju odpoveď zdôvodnite.

- 27.** Nech $I, J \subset k[x_1, \dots, x_n]$ sú ideály. Ukážte, že

$$\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}.$$

- 28.** Nech $X \subset \mathbb{A}^n$. Ukážte, že ideál $I(X)$ je radikálový.
- 29.** Nech $I = (x^2y + xy^2, x^2y - xy^2)$ je ideál v $k[x, y]$. Nájdite \sqrt{I} .
- 30.** Nech $I = (x^4 - 2x^2y^2 + y^2, x^4 - y^2) \subset \mathbb{C}[x, y]$. Zistite, či $x^2 - y^2 \in \sqrt{I}$ a či $x^2 + y^2 \in \sqrt{I}$.
- 31.** Nájdite radikál ideálu $(x^2y^4 - y^2, 1 - x^3y^3) \subset \mathbb{C}[x, y]$.
- 32.** (m) Nech k je pole, ktoré nie je algebraicky uzavreté a nech $X \subset \mathbb{A}^n(k)$ je ľubovoľná algebraická varieta. Ukážte, že existuje polynóm $g \in k[x_1, \dots, x_n]$ taký, že $X = V(g)$. (Návod: existuje polynóm $h \in k[y_1, \dots, y_r]$ taký, že $V(h) = \{(0, \dots, 0)\}$? Ak áno, vedeli by ste ho využiť?)